

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЦИНОКАП®

Регистрационный номер: ЛСР-010496/08

Торговое название: Цинокап®

Международное непатентованное название: Пиритион цинк

Лекарственная форма: крем для наружного применения

Состав:

100 г крема содержат:

активное вещество - пиритиона цинка (в пересчете на 100 % вещество) – 0,2 г (0,2%);

вспомогательные вещества: макрогола цетостеарат, цетостеариловый спирт, парафин жидкий (масло вазелиновое), пропиленгликоль, декспантенол (D-Пантенол), натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата додекагидрат, вода очищенная.

Описание

Крем белого или белого с желтоватым оттенком цвета без запаха или со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: дерматопротекторное средство

Код АТХ: D11AX12

Фармакологическое действие

Пиритион цинк обладает противовоспалительной, антибактериальной и противогрибковой активностью. Антибактериальная активность пиритиона цинка проявляется в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp.) Пиритион цинк снижает внутриклеточный уровень АТФ, способствует деполяризации клеточных мембран, вызывая гибель грибов и бактерий. Противогрибковая активность особенно выражена в отношении грибов рода *Malassezia* (ранее – *Pityrosporum ovale* и *Pityrosporum orbiculare*), вызывающих воспаление и избыточное шелушение при перхоти, себорейном дерматите, псориазе и других заболеваниях кожи. Механизм противовоспалительного действия не изучен.

Фармакокинетика

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания к применению

- псориаз
- атопический дерматит (экзема, нейродермит)
- себорейный дерматит
- сухость кожи

Противопоказания

Гиперчувствительность, детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для наружного применения.

Применяют у взрослых и детей с 1 года.

Крем наносят тонким слоем на пораженные участки 2-3 раза в сутки.

Длительность лечения при:

- псориазе – 1-1,5 месяца, повторные курсы – при появлении признаков обострения;
- атопическом дерматите – 3-4 недели;
- себорейном дерматите – 2 недели;

Побочное действие

Препарат обычно хорошо переносится. Иногда отмечаются аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки пиритиона цинка не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимого взаимодействия пиритиона цинка с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Форма выпуска

Крем для наружного применения 0,2 %.

По 25 г или 50 г в тубы алюминиевые.

Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом месте, при температуре от 4 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

ПАО "Отисифарм", Россия, 123317, г. Москва, ул. Тестовая, д.10

Тел.: +7 (800) 775-98-19

Факс: +7 (495) 221-18-02

[www:otcpharm.ru](http://www.otcpharm.ru)

Производитель

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»

Юридический адрес: 634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 211,
тел./факс (3822) 40-28-56.

Адрес производства: 634009, Россия, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 89,
тел./факс (3822) 40-28-56.